

# Gartenkalender März

Bis Monatsmitte können noch **Tomaten und Paprika** ausgesät werden. Auch andere Gemüsejungpflanzen und Blumen können im Zimmer, Frühbeet und Gewächshaus vorgezogen werden. Nach dem Aufgehen müssen die Sämlinge möglichst hell und besser kühl stehen, da sie bei warmem dunklem Stand vergeilen. Radieschen, Möhren, Schwarzwurzeln, Salat und Kohlrabi keimen unter einer Vliesabdeckung auch schon im Freiland.

Im Frühbeet und im ungeheizten Gewächshaus können frühe Sorten Salat und Kohlrabi ausgepflanzt werden. Gemüsepflanzen für den Anbau im Freiland können ab Mitte März im Gewächshaus angezogen werden.

Da im **Gewächshaus** die Einhaltung einer normalen Fruchtfolge nicht möglich ist, sollte zumindest ein Teil der **Erde** in regelmäßigen Abständen gegen mit gut verrottetem Kompost verbesserte Erde aus dem Garten **ausgetauscht** werden.

Vorgekeimte **Frühkartoffeln** können bei einer Bodentemperatur von 8°C in die Erde gelegt werden. Mit einer Vlies- oder Folienabdeckung der Anbaufläche kann eine frühere Ernte ermöglicht werden.

Als Saatkartoffeln sollten aus Pflanzenschutzgründen nur zertifizierte Saatkartoffeln verwendet werden. Für 10 m<sup>2</sup> reichen etwa 3 kg Saatkartoffeln aus.

Werden bei der Vorbereitung der Gemüseanbauflächen jetzt etwa 3 Liter **Kompost** je Quadratmeter oberflächlich in den Boden eingearbeitet, erübrigt sich der Einsatz von Mineraldünger. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Beim vorgesehenen Anbau von Starkzehrern wie Kohl oder Zuckermais können zusätzlich Hornspäne gegeben werden, ebenso bei der Pflanzung starkzehrender Prachtstauden.

Die vorbereiteten Beete nach dem Glattharken noch 2 Wochen ruhen lassen, damit sich der Boden vor der Aussaat noch ausreichend setzen kann.

Zur Pflege des **Rasens** sollte dieser jetzt mit einer Eisenharke abgeharkt und dann gedüngt werden, am Besten mit Kompost. **Vertikutiert** wird erst **nach** dem ersten Rasenschnitt, wenn die Wurzeln wieder voll ausgebildet sind.

Schnittmaßnahmen beim Kernobst sind bis Monatsende abzuschließen. Von Mehltau befallene Triebspitzen an Apfelbäumen und Stachelbeersträuchern werden kräftig zurückgeschnitten.

Sommerblühende **Clematis** können vor dem Austrieb im März kräftig zurückgeschnitten werden

Mit dem **Rosenschnitt** wartet man noch bis zur Forsythienblüte.

Überwinterte sommerblühende Zwiebel- und Knollenpflanzen wie Dahlien, Schopflilien oder Canna können in Töpfen vorgetrieben und nach den Eisheiligen mit Ballen ausgepflanzt werden.

## Bodenprobe

Gartenfreunde, die sich für den Zustand ihres Bodens (Nährstoff- und Humusgehalt, Schwermetallbelastung) und den richtigen Düngebedarf interessieren, können im Rahmen eines Projektes der TU Berlin ein preisgünstiges Angebot nutzen. Nähere Angaben dazu unter <http://www.kleingarten-shop.de/>.

Das Angebot wurde bis zum 15.04.2016 verlängert

### Termine:

**02.04.16 12 - 17 Uhr**

**Pflanzkartoffeltag in der Naturschutzstation Malchow**

Angeboten werden Saatkartoffeln und Sämereien alter Gemüse- und Zierpflanzensorten

Otto Frauenberger  
Stellv. Bezirksgartenfachberater